

ろう。

## Résumé

The systematic relationships in the genera which have been included in Festuceae (except Festucinae, Triodiinae and Glyceriiae), Monermeae and Triticeae by late Dr. R. Pilger (1954) were discussed mainly from the standpoints of the chromosome situation, characteristics of leaf structure and distribution.

## 引用文献

- N. Avdulov 1931, R. Pilger 1954, H. Prat 1936 は前報に記したので省略する。  
 Bews, J. W. 1929 Longmans, Green and Co., London. Boyle, W. S. 1944 Madrono  
**7**: 129-160. ——— 1945 Ibid. **8**: 1-32. Hansen, I. and E. Potztal 1954 Bot. Jb.  
**76**: 251-270. Habbard, C. E. 1946 Blumea Suppl. III: 10-21. ——— 1954 Pelican  
 Books A 295. London. Hunter, A. W. S. 1934 Canad. Jour. Res. **11**: 213-244.  
 Hylander, N. 1950 Seventh Int. Bot. Congr. Stockholm: 854-855. Melderis, A. 1950  
 Seventh Int. Bot. Congr. Stockholm: 853-854. Nielsen, E. L. and L. M. Humphrey  
 1937 Amer. Jour. Bot. **24**: 276-279. Nygren, A. 1949 Hereditas **35**: 27-32. Ono,  
 H. and T. Tateoka 1953 Bot. Mag. Tokyo **66**: 18-27. Stebbins Jr. G. L. 1949 a  
 Portugal. Acta Bio. Series A 1949: 106-136. ——— 1949 b Proc. Eighth Int.  
 Congr. Genet. Hereditas Suppl.: 461-485. ——— and R. M. Love 1941 Amer.  
 Jour. Bot. **28**: 371-382. ——— et al. 1946 a Amer. Jour. Bot. **33**: 338-351.  
 ——— 1946 b Ibid. **33**: 579-586. ——— 1949 Ibid. **36**: 291-301. ———  
 1950 Ibid. **37**: 383-388. ——— 1953 Ibid. **40**: 444-449. ——— 1954 Genetics  
**39**: 378-395. 館岡亜緒 1954 植研雑 **29**: 341-347. ——— 1955 同 **30**: 199-208.  
 ——— in press a, Cytologia. ——— in Press b, Bot. Mag. Tokyo.

○ヒロハコンロンカ対馬に産す (外山三郎) Saburō TOYAMA: *Mussaenda shikokiana* found in Tusima Islands, Kiushu.

ヒロハコンロンカは九州でも稀なもので、肥前では男女群島(竹内氏)、五島富江、大村市外竜頭泉、黒髪山に稀産する。対馬ではまだ採集されていなかったが、私は1955年の夏、同島厳原町の裏、有明山麓の雑木林で可なり大きなもの二株をみつけた。白色花べん状になつたがく片が若い実の頭端に宿存しているかつこうは、まことに奇異で面白いつた。(長崎大学学芸学部)